

Duprancil®

USO VETERINÁRIO AMOXICILINA TRI-HIDRATADA USO ORAL

DUPRANCIL® é uma penicilina semissintética obtida a partir do ácido 6 amino penicilâmico (6APA); difere da ampicilina por conter uma hidroxila a mais em sua molécula. Usada por via oral, sob a forma de tri-hidrato, uma vez absorvida, não sofre modificações no organismo e apresenta concentrações séricas e tissulares duas vezes maiores que a ampicilina. A ingestão de alimento não reduz significativamente a absorção da amoxicilina que não parece ser metabolizada no organismo, a excreção é rápida e o antibiótico é recuperado inalterado. Somente 17% da amoxicilina se liga às proteínas séricas.

Fórmula: cada 100 g de pó contém:
Amoxicilina (referência base) 7,5 g
Excipiente q.s.p. 100,0 g

Indicações:
DUPRANCIL® é um bactericida altamente eficaz contra germes Gram-positivos e Gram-negativos. Está indicado no tratamento das infecções bacterianas de cães e gatos, nas mais variadas localizações, intensidades e cursos, agudas e crônicas, tais como infecções das vias respiratórias (pneumonias, bronquites, broncopneumonias) causadas pelos gêneros *Streptococcus*, *Staphylococcus* coagulase positivo, *Bordetella bronchiseptica*, *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus*, *Corynebacterium diptheriae*; trato gastrointestinal (estomatites, gastrites, enterites) causadas por *Salmonella*, *E. coli*, *Shigella*, *Proteus*; vias urinárias (nefrites, cistites, pielonefrites) causadas por *Corynebacterium*; infecções ginecológicas (*Streptococcus*, *Brucella*, *E. coli*); infecções dermatológicas (otites, dermatites, piodermites) causadas por *Staphylococcus aureus*, *S. intermedius*, *Streptococcus*; septicemias principalmente por *Salmonella*; endocardites causadas por *Streptococcus* e outras doenças causadas por bactérias sensíveis à amoxicilina.

Modo de usar:
Frasco contendo pó para preparação de suspensão, na concentração de 250 mg de amoxicilina por 5 mL. Agitar para tornar o pó solto dentro do frasco, adicionar água até o líquido reconstituído atingir a linha de nível marcada no frasco, tampar, inverter o frasco e agitá-lo. Fica reconstituído um volume de 150 mL de suspensão para os frascos contendo 100 g de pó e 60 mL de suspensão para os frascos contendo 40 g de pó, que se mantêm estáveis à temperatura ambiente por 7 dias ou em refrigeração por 14 dias.


Posologia:
Cães e gatos: 20 a 40 mg/kg divididos em 2 ou 3 administrações diárias, ou seja, a cada oito ou doze horas, por via oral, durante 7 dias ou até o desaparecimento dos sintomas de infecção; salientando a continuidade do tratamento por período de tempo não inferior a 48 horas após desaparecimento do quadro clínico.

Contraindicação e Efeito colateral:
Não deve ser indicado para animais com hipersensibilidade à amoxicilina. Não se recomenda a aplicação nas infecções por estafilococos penicilino-resistentes e nas produzidas por bacilos piocianicos, rickettsias e vírus. Embora nenhum estudo controlado tenha sido registrado, não há referências de efeitos tóxicos nas dosagens indicadas. Podem ocorrer distúrbios gastrointestinais (náuseas, vômitos e diarreias) leves e ocasionais que regredem espontaneamente com a interrupção da medicação, ou até mesmo com sua continuação, cuidando para aplicar o medicamento junto às refeições. Reações cutâneas podem ocorrer: urticária, edema de cara, focinho e pálpebras.

Apresentação:
Embalagens contendo 40 g ou 100 g de pó com seringa dosadora.
Conservar em temperatura ambiente, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 6.499 em 18/08/98.
Resp. Técnico: Daniel Alves – CRF/RJ nº 21354

Instruções de Uso:



1- Retire a tampa do frasco e complete com água filtrada até a linha da marca do nível.

2- Tampe o frasco e agite vigorosamente e, se preciso for, complete com água filtrada novamente até o nível indicado.

Obs: Esta operação só deverá ser feita ao iniciar o tratamento. Após a utilização da 1ª dose não completar mais com água.



O adaptador e dosador oral oferece:


- Facilidade na administração do medicamento
- Dosagem correta da posologia prescrita
- Perfeita visualização da dosagem
- Evita perda por derramamento do produto
- Não há perda na aspiração, no manuseio e na administração do medicamento



1- Segure o frasco com firmeza e introduza o adaptador de plástico na boca do mesmo, forçando-o para baixo, até encaixá-lo perfeitamente.



2- Retire a tampa protetora de plástico, da ponta do dosador puxando-a para baixo.



3- Introduza a ponta do dosador no adaptador (A) e vire o frasco com a boca para baixo (B). Segure com firmeza o frasco com uma das mãos. Com a outra puxe o êmbolo até a marca desejada utilizando o polegar e o indicador.



4- Vire o frasco com a boca para cima. Retire o dosador segurando com uma das mãos e o adaptador com a outra.

5- Coloque o dosador na boca do animal e administre o medicamento lentamente. Após o uso, lave o dosador e reponha a tampa protetora.



Proprietário:
LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.
Rua Almirante Oliveira Pinto, 267 – Colégio
CEP: 21371-510 – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 32.465.155/0001-90
Indústria Brasileira – Marca Registrada

Fabricante:
Vansil Indústria, Comércio e Representações Ltda.
R. João Augusto Cirelli, 640
Distrito Industrial – Descalvado – SP
CEP: 13690-000 – Tel.: (19) 3593-9999
CNPJ: 50.472.547/0001-68

SAC: (21) 2471-7021 / 2473-7769
www.laboratorio-duprat.com.br



PRODUTO: Duprancil
CÓDIGO: 2793
CÓD. EAN13: N/A
SOFTWARE: Adobe Illustrator CC
Nº DE CORES: 1
DIMENSÕES: 120 x 180 mm
FONTES: Folks; Helvetica Neue LT Std.
REF. DE COR: ■ Black 100%

REF. GRÁFICA: □ Faca

DATA: 11/12/20
VERSÃO: 08
DESIGNER: Amanda Bragard

JOB NUMBER:
VERSÃO: 08
VER. ANTIGA: 07
RAZÃO DA ALTERAÇÃO: Alteração de logo e versão.

APROVADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DATA:**

CONTROLE DE QUALIDADE: **DATA:**