

# Emetim

## Duprat Injetável

### USO VETERINÁRIO

#### CÃES E GATOS

**Fórmula:** cada 100 mL contém:  
Cloridrato de metoclopramida (equivalente a 423,8 mg de metoclopramida base) ..... 500 mg  
Veículo q.s.p. .... 100 mL

**Indicações:** **EMETIM DUPRAT INJETÁVEL** é composto de um potente antiemético, metoclopramida, que possui efeitos contrais e periféricos no sistema gastrointestinal. Está indicado nas desordens gástricas, como náuseas e vômitos; nos casos de reflexos gastroesofageanos, tumores gástricos e dilatações gástricas.

**Modo de usar:** **EMETIM DUPRAT INJETÁVEL** pode ser administrado por via intramuscular, subcutânea ou endovenosa lenta.

**Posologia:** cães e gatos: para cada 1,0 kg de peso vivo, administrar de 0,04 mL a 0,1 mL por via subcutânea ou intramuscular, a cada 8 horas (3 vezes ao dia).

Em aplicação endovenosa lenta, administrar de 0,2 mL a 0,4 mL para cada 1,0 kg de peso vivo, a cada 24 horas (1 vez ao dia).

A duração do tratamento deverá se estender até o término dos sintomas.

Quando for o caso de desordens da motilidade gástrica e esofagite de refluxo, administrar o produto 30 minutos antes das refeições e quando do recolhimento do animal. Estas orientações deverão ser seguidas a critério do Médico Veterinário; até o animal se restabelecer.

**Contraindicações:** **EMETIM DUPRAT INJETÁVEL** está contraindicado nas obstruções a nível de piloro ou nos casos de perfuração intestinal.

A droga não deverá ser utilizada em animais epiléticos, visto que poderá aumentar o número de convulsões. Devido ao potencial de promoções de efeitos do SNC (Sistema Nervoso Central), essa droga não deverá ser administrada juntamente com fenotiazínicos ou analgésicos narcóticos. Drogas anticolinérgicas, como a atropina, bloqueiam os efeitos da metoclopramida sobre a motilidade gastrointestinal.

Nos casos de envenenamento e na prenhez.

**Efeitos colaterais:** os efeitos colaterais mais frequentes são: inquietude, sonolência, fadiga, tontura, náuseas, cefaleia, distúrbios intestinais. Podem ocorrer sintomas extrapiramidais, após uma única dose.

A metoclopramida pode aumentar os níveis séricos da prolactina, o que pode ser contraindicado em neoplasias mamárias.

#### VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

**Apresentação:** frasco-ampola de vidro contendo 10 mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 5.997 em 13/06/97.  
Responsável Técnico: Daniel Alves  
CRF/RJ nº 21.354.

#### Proprietário:

**LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA**  
R. Almirante Oliveira Pinto, 267 – Colégio  
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21371-510  
CNPJ: 32.465.155/0001-90  
Indústria Brasileira – Marca Registrada.

#### Fabricante:

**VANSIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**  
R. João Augusto Cirelli, 640  
Distrito Industrial – Descalvado – SP – CEP: 13690-000  
Tel.: (19) 3593-9999  
CNPJ: 50.472.547/0001-68

SAC: (21) 2471-7021 / 2473-7769  
www.laboratorio-duprat.com.br



**PRODUTO:** Emetim Duprat Injetável 10 mL  
**CÓDIGO:** 194  
**CÓD. EAN13:** N/A

**SOFTWARE:** Adobe Illustrator CC  
**Nº DE CORES:** 1  
**DIMENSÕES:** 60 x 120 mm

**FONTES:** Helvetica Neue LT STD; Folks  
**REF. DE COR:**  Black

**REF. GRÁFICA:**  Faca

**DATA:** 19/01/21  
**JOB NUMBER:**  
**VERSÃO:** 07

**DESIGNER:** Amanda Bragard  
**VERSÃO:** 07  
**VER. ANTIGA:** 06  
**RAZÃO DA ALTERAÇÃO:** Alteração de versão.

**APROVADO POR:**



**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

**DATA:**

**CONTROLE DE QUALIDADE:**

**DATA:**