

Meloxivet 6 mg

Grande porte

USO VETERINÁRIO

USO ORAL

MELOXICAM

Meloxivet 6 mg - Grande Porte é um produto à base de Meloxicam, que é um analgésico e anti-inflamatório não-esteróide (AINE) pertencente à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Também possui ação antipirética.

O Meloxicam inibe a biossíntese de prostaglandinas mais intensamente no local da inflamação que na mucosa gástrica ou nos rins. Acredita-se que este perfil favorável de segurança esteja relacionado a uma inibição preferencial pela ciclooxigenase-2 (COX-2) em relação à ciclooxigenase-1 (COX-1). Acumulam-se evidências demonstrando que a inibição da COX-2 proporciona os efeitos terapêuticos dos anti-inflamatórios não-esteróides, enquanto a inibição da COX-1 é responsável pelos efeitos colaterais gástricos e renais. Estudos clínicos demonstraram pouca incidência de reações gastrointestinais com as doses recomendadas de Meloxicam que com as doses usuais de outros AINEs.

Em cães, Meloxicam é bem absorvido depois da administração oral. Alimentos não alteram sua absorção.

Fórmula: Cada comprimido de 100mg contém:

Meloxicam 6 mg
Excipiente q.s.p. 100 mg

Indicações:

Meloxivet 6 mg - Grande Porte é indicado para o tratamento e alívio da dor e da inflamação em patologias agudas ou crônicas associadas ao sistema musculoesquelético de cães: analgesia pós-cirúrgica, luxações, ruptura de ligamento, fraturas, claudicações, entorses, traumatismo, biópsias ósseas, osteossarcoma, necrose asséptica da cabeça do fêmur, osteoartrites, artrites, artroses, displasias e cistite intersticial.

Modo de usar:

Destacar o comprimido de **Meloxivet 6 mg - Grande Porte** do strip no momento da aplicação e administrá-lo por via oral, diretamente na boca do animal.

Posologia:

CÃES:

- Osteoartrites, analgesia e condições inflamatórias: 0,2 mg/kg, via oral, uma vez inicialmente, seguida por 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia (junto a refeição),
- Analgesia pós-cirúrgica: 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia,
- Dor crônica: 0,2 mg/kg, via oral, uma vez inicialmente, seguida por 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia.

A duração do tratamento é variável em média de 5 a 14 dias, dependendo da resposta clínica do animal sendo que após este período o Médico Veterinário deverá avaliar o caso.

Efeitos Colaterais:

Distúrbios gastrointestinais podem ser mais comuns (vômitos, diarreia e anorexia), mas

aparentemente são transitórios, desaparecendo na interrupção ou após a finalização do tratamento.

Contraindicações:

Não deve ser indicada para animais hipersensíveis ao Meloxicam ou com ativas ulcerações gastrointestinais ou sangramento, enfraquecida função hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos.

Não é recomendado o uso em fêmeas prenhes ou em lactação, ou em animais com menos de 6 semanas de idade.

Não administrar o produto em associação com drogas anticoagulantes ou no caso de intoxicação com as mesmas.

Interações medicamentosas:

Devido à alta ligação de Meloxicam às proteínas plasmáticas, ele pode substituir ou ser substituído por outras drogas também altamente ligadas à proteína, incluindo warfarim, fenilbutazona, etc.

Meloxicam pode inibir a agregação plaquetária e também causar ulceração gastrointestinal, se usado com outras drogas que alteram a hemostasia (ex.: heparina, warfarim, etc.) e/ou causam erosão gastrointestinal (ex.: aspirina, flunixin, fenilbutazona, corticosteróides, etc.), aumentar a probabilidade de sangramento ou ulceração.

Antagonismo:

Meloxicam pode antagonizar os efeitos anti-hipertensivos dos inibidores da acepromazina.

Precauções:

Ter cautela em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, devido ao potencial risco de desenvolvimento de toxicidade renal.

Intoxicação e superdosagem em animais:

Não há informação específica; sugere-se tratar sintomaticamente e com suporte geral.

Intoxicação no Homem:

Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente o médico, não existe um antídoto específico.

Apresentação:

Cartucho contendo 1 strip aluminizado contendo 10 comprimidos de 100 mg cada e cartucho contendo 12 strips aluminizados contendo 120 comprimidos de 100 mg cada.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8.954 em 19/08/2004

Responsável Técnico: Landila Adriana Meyer – CRMV/RJ nº 4.501

Proprietário e Fabricante:

LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.

Av. Presidente Tancredo Neves, s/nº

Cidade Jardim Marajoara – Engenheiro Pedreira

Japeri – RJ

CEP 26410-050 – CNPJ: 32.465.155/0004-32

Indústria Brasileira / Marca Registrada

SAC: (21) 2664-2761 / 2664-6706
www.laboratorio-duprat.com.br



PRODUTO: BU Meloxicam 6mg
CÓDIGO: 197-07
CÓDIGO EAN13:

SOFTWARE: Adobe Illustrator CC
Nº DE CORES: 1
DIMENSÕES: 90 x 150 mm
FONTES: Helvetica Neue LT Std
REF. DE COR: ■ BLACK

REF. GRÁFICA: □ FACA

DATA: 30/06/21
VERSÃO: 2
DESIGNER: Amanda Bragard

VERSÃO: 2
VER. ANTIGA: 1
RAZÃO DA ALTERAÇÃO: Alteração de logomarca.

APROVADO POR:



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:

CONTROLE DE QUALIDADE:

DATA: