

Duotrill 50 mg

Comprimidos

USO VETERINÁRIO
VIA ORAL

ANTIMICROBIANO DE AMPLO
ESPECTRO PARA CÃES E GATOS

Fórmula:

Cada comprimido de 150 mg contém:

Enrofloxacino base 50 mg
Excipiente q.s.p. 150 mg

Indicações:

Duotrill 50 mg Comprimidos é um antibiótico de amplo espectro de ação recomendado no tratamento de infecções produzidas por microrganismos Gram-negativos e Gram-positivos, que acometem cães e gatos, tais como: *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Enterobacter sp.*, *Pasteurella haemolytica*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus canis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pyogenes*. Nas gastroenterites, enterites agudas, subagudas e crônicas, causadas por *Escherichia coli*, *Enterobacter sp.*, *Proteus sp.* e *Pseudomonas aeruginosa*. Infecções geniturinárias, causadas por *E. coli*, *Klebsiella sp.*, *Enterobacter sp.*, *Proteus sp.*, *Pseudomonas sp.*. Nas pneumonias aguda, subaguda e crônica, bronquite e broncopneumonia, causadas por *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Pasteurella sp.* e *Escherichia coli*. Infecções respiratórias causadas por *Bordetella bronchiseptica*.

Modo de usar:

Administrar os comprimidos através da via oral, de acordo com o peso do animal a ser tratado. Tratamento curativo para cães e gatos com idade acima da fase de crescimento: 5mg/kg de peso corpóreo ao dia, equivalente a 1 comprimido de **Duotrill 50mg Comprimidos** para cada 10kg de peso corpóreo, diariamente, durante 5 dias, sendo que o tratamento deve ser prolongado por período não inferior a 48 horas (dois dias) após o desaparecimento dos sintomas. O intervalo entre as doses pode ser de 24 horas ou a dose diária dividida de 12/12 horas, ou seja duas vezes ao dia (2,5mg/kg a cada 12 horas).

Dosagem:

5 mg/kg de peso por dia, o equivalente a 1 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo, diariamente, durante 5 dias.

TABELA DE DOSAGEM

PESO DO ANIMAL (kg)	DOSE DIÁRIA (comprimidos)
10	1
20	2
30	3
40	4
50	5

Contraindicações:

Sugere-se a não utilização de Enrofloxacino durante a gestação e lactação, e nos animais em fase de crescimento para evitar erosões nas cartilagens dos animais jovens em fase de crescimento.

Efeitos colaterais:

Podem ocorrer náuseas, vômitos e urticária, erosões nas cartilagens dos animais jovens em fase de crescimento. Nestes casos, indica-se a interrupção da administração do medicamento.

Interações:

A coadministração de probenicida diminui a excreção urinária da droga. Assim como todos os ácidos orgânicos antimicrobianos foi demonstrado antagonismo "in vitro" com a nitrofurantoina. Foram relatados aumentos dos níveis plasmáticos de teofilina com o uso concomitante de quinolonas. Foram relatados níveis elevados de ciclosporina com o uso concomitante de fluorquinolonas, portanto os níveis séricos de ciclosporina devem ser monitorados e ajustada a posologia, se estas drogas forem usadas simultaneamente. Quinolonas podem potencializar os efeitos do anticoagulante oral varfarina e seus derivados quando administrados concomitantemente. Multivitaminas, antiácidos, sucralfato ou produtos contendo Fe ou Zn, podem intervir na absorção e resultar níveis mais baixos de Enrofloxacino no plasma e na urina.

O uso de quinolonas em combinações com tembrefeno podem levar a convulsões. Desta forma a administração concomitante deve ser evitada.

OBS.:* O tratamento deve ser prolongado por período não inferior a 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

* O Enrofloxacino é contraindicado em cães de raças pequenas e médias durante a fase de crescimento rápido (entre 2 e 8 meses de idade).

* Nas raças grandes de cães, este período poderá chegar até 18 meses.

* Não é recomendada a utilização em gatos com idade inferior a 2 meses.

* Conservar em local seco e fresco, ao abrigo dos raios solares, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

* Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Apresentação:

Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos de 150 mg cada e cartucho contendo 12 blisters com 10 comprimidos de 150 mg cada.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº6.182 em 18/11/1997

Responsável técnico: Landila Adriana Meyer – CRMV/RJ nº 4.501

Proprietário e Fabricante:

LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.

Av. Presidente Tancredo Neves, s/nº

Cidade Jardim Marajóara – Engenheiro Pedreira

Japeri – RJ

CEP 26410-050 – CNPJ: 32.465.155/0004-32

Indústria Brasileira / Marca Registrada

SAC: (21) 2664-2761 / 2664-6706
www.laboratorio-duprat.com.br



Informações Técnicas:

Revisado e Aprovado por:

Produto: BU Duotrill 50 mg	Data da criação: 19/02/2021	Responsável Técnico: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Data: _____	Controle de Qualidade: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Data: _____
Código: 185	Versão anterior: 08	Data: _____	Data: _____
Nº de cores: 1	Versão: 09		
Software: Adobe Illustrator CC	Razão da alteração: Alteração de arte.	Código EAN13: N/A	
Dimensões: 90 x 150 mm		Marcação visual: N/A	
Referência Pantone: Black 100%	Área Técnica: Faca	Fontes: Folks; Helvetica Neue LT Std.	
	Controle GQD: 4	Design: Fabie B.	