

# Duprantel®

## Gatos

### USO VETERINÁRIO

### USO ORAL

## VERMÍFUGO À BASE DE PRAZIQUANTEL E PAMOATO DE PIRANTEL PARA GATOS

#### Fórmula:

Cada comprimido de 340 mg contém:

Praziquantel .....	20 mg
Pamoato de pirantel.....	230 mg
Excipiente q.s.p. ....	340 mg

#### Indicações:

Vermífugo de largo espectro para o combate e eliminação de endoparasitas, tais como: **cestódeos** (vermes chatos): *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Taenia spp.* e **nematódeos** (vermes redondos): *Ancylostoma braziliense*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*.

#### Modo de usar:

Administrar o comprimido de **DUPRANTEL GATOS** conforme posologia, por via oral, em dose única, sem jejum prévio. Pode ser administrado diretamente na boca do animal ou misturado ao alimento de preferência do animal (ração ou carne).

#### Posologia:

##### Gatos:

PESO CORPORAL DO ANIMAL (kg)	COMPRIMIDOS
Até 1kg	¼
de 1 a 2 kg	½
de 2 a 3 kg	¾
de 3 a 4 kg	1

#### Efeitos colaterais:

Não apresenta.

#### Contraindicações:

Devido aos mecanismos de ação serem similares, pirantel não é recomendado ser usado com morantel ou levamisole. A observação de efeitos adversos pode ser intensificada se usado com organofosforados ou dietilcarbamazina.

#### Interações medicamentosas:

Devido aos mecanismos de ação serem similares, pirantel não é recomendado ser usado com morantel ou levamisole. A observação de efeitos adversos pode ser intensificada se usado com organofosforados ou dietilcarbamazina.

#### Antagonismo:

Piperazina e pirantel têm mecanismos de ação antagonistas; não utilizá-los juntamente.

#### Precauções:

Em paralelo com a vermifugação, fazer uma limpeza profunda do ambiente, usando produtos à base de cloro ativo, de alta eficácia no combate às larvas e aos ovos de parasitas.

As fêmeas devem ser tratadas antes da cobertura e 10 dias antes da parição.

Tratar os filhotes durante a lactação e depois do desmame no 2º, 4º, 8º e 12ª semanas, com 4,5 e 6 meses. O tratamento de animais adultos pode ser feito a cada 3 meses.

Para evitar reinfestações por *Dipylidium caninum*, indica-se aplicar em paralelo um tratamento antipulga, já que a mesma é o hospedeiro intermediário deste verme.

As larvas de *Ancylostoma* penetram na pele ou pela ingestão das mesmas se o ambiente estiver contaminado.

A gata ao ingerir aves e roedores pode ser contaminada pelo *Toxocara cati*, que pode infestar os filhotes através do leite. As larvas desde parasita permanecem na musculatura da gata em estado latente e podem causar infestações por várias crias seguintes.

Seguir corretamente a orientação para vermifugar os gatos, já que os cestódeos e nematódeos constituem-se em risco à saúde do Homem.

#### Intoxicação e superdosagem:

O produto é bastante seguro, nas doses indicadas, sendo que o mesmo aplicando 40 vezes a dose recomendada, o único efeito colateral notado, ocasionalmente, foi vômito.

(Praziquantel)/DL50: 2g/kg

O Pirantel é bastante seguro; doses de até 7 vezes a recomendada geralmente não resultam em reação tóxica. Sintomas de toxicidade que poderiam ser vistos incluem: aumento da frequência respiratória, ataxia ou outros efeitos colinérgicos.

#### Intoxicação do Homem:

O Praziquantel é um produto de baixa toxicidade. Não existem relatos de fenômenos decorrentes de superdosagem em humanos.

Em caso de ingestão de doses elevadas, recomenda-se administrar carvão ativado ou laxarivos de ação rápida tais como, sulfato de magnésio (15g) ou fosfato de sódio (4g).

Considerando a rapidez com que o praziquantel é absorvido, a administração desses agentes só é eficaz nas primeiras três horas após a ingestão do produto.

As reações adversas gerais desaparecem rapidamente e não exigem tratamento. As reações adversas decorrentes de alergia ao praziquantel devem ser tratadas com antialérgicos e/ou corticóides.

#### Apresentação:

Cartucho contendo 4 comprimidos e embalagem hospitalar contendo 60 comprimidos embalados em strip aluminizado.

**Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

#### Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº.8.952 em 18/08/04  
Responsável Técnico: Landila Adriana Meyer – CRMV/RJ nº 4.501

#### Proprietário:

##### LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.

Av. Presidente Tancredo Neves, s/nº

Cidade Jardim Marajoara – Engenheiro Pedreira - Japeri – RJ

CEP 26410-050 – CNPJ: 32.465.155/0004-32

Indústria Brasileira / Marca Registrada

#### Fabricante:

##### Vansil Indústria, Comércio e Representações Ltda.

R. João Augusto Cirelli, 640 – Distrito Industrial

Descalvado – SP – CEP: 13690-000

Tel.: (19) 3593-9999

CNPJ: 50.472.547/0001-68

**SAC: (21) 2664-2761 / 2664-6706**

**www.laboratorio-duprat.com.br**