

# Meloxivet 2 mg

## Médio porte

### USO VETERINÁRIO

### USO ORAL

### MELOXICAM

**Meloxivet 2 mg - Médio Porte** é um produto à base de Meloxicam, que é um analgésico e anti-inflamatório não-esteróide (AINE) pertencente à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Também possui ação antipláquetica.

O Meloxicam inibe a biossíntese de prostaglandinas mais intensamente no local da inflamação que na mucosa gástrica ou nos rins. Acredita-se que este perfil favorável de segurança esteja relacionado a uma inibição preferencial pela ciclooxigenase-2 (COX-2) em relação à ciclooxigenase-1 (COX-1). Acumulam-se evidências demonstrando que a inibição da COX-2 proporciona os efeitos terapêuticos dos anti-inflamatórios não-esteróides, enquanto a inibição da COX-1 é responsável pelos efeitos colaterais gástricos e renais. Estudos clínicos demonstraram pouca incidência de reações gastrointestinais com as doses recomendadas de Meloxicam que com as doses usuais de outros AINEs.

Em cães, Meloxicam é bem absorvido depois da administração oral. Alimentos não alteram sua absorção.

**Fórmula:** Cada comprimido de 100 mg contém:

Meloxicam ..... 2 mg  
Excipiente q.s.p. .... 100 mg

#### Indicações:

**Meloxivet 2 mg - Médio Porte** é indicado para o tratamento e alívio da dor e da inflamação em patologias agudas ou crônicas associadas ao sistema musculoesquelético de cães: analgesia pós-cirúrgica, luxações, ruptura de ligamento, fraturas, claudicações, entorses, traumatismo, biópsias ósseas, osteossarcoma, necrose asséptica da cabeça do fêmur, osteoartrites, artrites, artroses, displasias e cistite intersticial.

#### Modo de usar:

Destacar o comprimido de **Meloxivet 2 mg - Médio Porte** do strip no momento da aplicação e administrá-lo por via oral, diretamente na boca do animal.

#### Posologia:

##### CÃES:

- Osteoartrites, analgesia e condições inflamatórias: 0,2 mg/kg, via oral, uma vez inicialmente, seguida por 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia (junto à refeição),
- Analgesia pós-cirúrgica: 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia,
- Dor crônica: 0,2 mg/kg via oral, uma vez inicialmente, seguida por 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia.

A duração do tratamento é variável, em média de 5 a 14 dias, dependendo da resposta clínica do animal, sendo que, após este período, o Médico Veterinário deverá avaliar o caso.

#### Efeitos colaterais:

Distúrbios gastrointestinais podem ser mais comuns (vômitos, diarreia e anorexia), mas

aparentemente são transitórios, desaparecendo na interrupção ou após a finalização do tratamento.

#### Contraindicações:

Não deve ser indicada para animais hipersensíveis ao Meloxicam ou com ativas ulcerações gastrointestinais ou sangramento, enfraquecida função hepática, cardíaca ou renal e desordens hemorrágicas.

Não é recomendado o uso em fêmeas prenhes ou em lactação, ou em animais com menos de 6 semanas de idade.

Não administrar o produto em associação com drogas anticoagulantes ou no caso de intoxicação com as mesmas.

#### Interações medicamentosas:

Devido à alta ligação de Meloxicam às proteínas plasmáticas, ele pode substituir ou ser substituído por outras drogas também altamente ligadas à proteína, incluindo warfarim, fenilbutazona, etc.

Meloxicam pode inibir a agregação plaquetária e também causar ulceração gastrointestinal, se usado com outras drogas que alteram a hemostasia (ex.: heparina, warfarim, etc.) e/ou causam erosão gastrointestinal (ex.: aspirina, flunixin, fenilbutazona, corticosteróides, etc.), aumentando a probabilidade de sangramento ou ulceração.

#### Antagonismo:

Meloxicam pode antagonizar os efeitos anti-hipertensivos dos inibidores da acepromazina.

#### Precauções:

Ter cautela em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, devido ao potencial risco de desenvolvimento de toxicidade renal.

#### Intoxicação e superdosagem em animais:

Não há informação específica, sugere-se tratar sintomaticamente e com suporte geral.

#### Intoxicação no Homem:

Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente o médico. Não existe um antídoto específico.

#### Apresentação:

Cartucho contendo 1 strip aluminizado contendo 10 comprimidos de 100 mg cada e cartucho contendo 12 strips aluminizados contendo 120 comprimidos de 100 mg cada.

**Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

**Venda sob prescrição do Médico Veterinário.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8.955 em 19/08/2004

Responsável Técnico: Landila Adriana Meyer – CRMV/RJ nº 4.501

#### Proprietário e Fabricante:

**LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.**

Av. Presidente Tancredo Neves, s/nº

Cidade Jardim Marajoara – Engenheiro Pedreira

Japeri – RJ

CEP 26410-050 – CNPJ: 32.465.155/0004-32


Indústria Brasileira / Marca Registrada

SAC: (21) 2664-2761 / 2664-6706  
www.laboratorio-duprat.com.br



PRODUTO: Meloxivet 2 mg  
CÓDIGO: 196  
CÓD. EAN13: N/A

SOFTWARE: Adobe Illustrator CC  
Nº DE CORES: 1  
DIMENSÕES: 90 x 150 mm

FONTES: Helvetica Neue LT STD; Folks  
REF. DE COR:  Black 100%

REF. GRÁFICA:  Faca

gqdgroupp.com.br

DATA: 27/05/2021  
VERSÃO: 09  
DESIGNER: Amanda

VERSÃO: 09  
VER. ANTIGA: 08  
RAZÃO DA  
ALTERAÇÃO: Alteração de logotipo.

APROVADO POR:



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:

CONTROLE DE QUALIDADE:

DATA: